

Состав и форма выпуска

Жидкость для инъекций слегка желтоватая, прозрачная; допускается легкая опалесценция, наличие мелкой кристаллической и тканевой взвеси.

Действующее вещество: 1 ампула содержит 2 мл жидкости, которую получают из замороженного стекловидного тела глаз разных видов убойного скота (крупного рогатого скота, свиней, коз).

Фармакологическое действие

Препарат имеет биостимулирующее действие, ускоряет процессы регенерации тканей, способствует улучшению процессов обмена, имеет стимулирующее влияние на образование костной мозоли. Имеет неспецифическое десенсибилизирующее и обезболивающее действие при невралгиях, фантомной боли, радикулитах и других заболеваниях периферической нервной системы, сопровождающейся болевым синдромом. Смягчает рубцовую ткань и способствует ее рассасыванию.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

- полиневрит, радикулит, невралгия, фантомная боль;
- профилактика избыточного разрастания соединительной ткани в раннем послеоперационном периоде;
- лечение ожоговых, послеоперационных, келоидных и другого происхождения рубцов;
- контрактура суставов;
- для ускорения образования костной мозоли при переломах.

Режим дозирования

Вводят п/к по 2 мл ежедневно. Курс лечения при невралгиях - 8-10 дней, при рубцах, контрактурах и переломах - до 25 дней.

Повторение курса лечения рекомендуется через один месяц или позднее.

Продолжительность курса лечения определяется индивидуально.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции в виде усиления боли и воспаления в области введения; крапивница, зуд, сыпь, гиперемия кожи, эритема, анафилактические реакции.

Противопоказания к применению

- инфекционные заболевания;
- острые воспалительные процессы;
- кахексия;
- нефрит;
- нефросклероз;
- цирроз печени;
- сердечная недостаточность II и III стадии;
- онкологические заболевания;
- беременность и период лактации;
- детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Опыта применения лекарственного средства у беременных и женщин в период кормления грудью нет, поэтому не следует применять данный препарат в эти периоды.

Особые указания

С осторожностью препарат назначают пациентам с отягощенным аллергоанамнезом.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами

Не установлено.

Передозировка

До настоящего времени явления передозировки при применении стекловидного тела не описаны.

Лекарственное взаимодействие

Не отмечено негативных явлений при применении препарата одновременно с другими лекарственными средствами.

Условия хранения препарата

Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не

замораживать.

Срок годности препарата

2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.